

Prise en charge transfusionnelle des patients chroniques

Dr AC Leprêtre
Site transfusionnel EFS
Hôpital Saint-Louis, Paris

Objectifs de l'EFS:

Permettre à un patient qui en a besoin d'être transfusé, au moment où il en a besoin:

GARANTIR LA SUFFISANCE ET ORGANISER LA REPARTITION DES PRODUITS EN FONCTION DES BESOINS


Garantir au patient que les produits qu'il va recevoir sont « sains »

GARANTIR LA SECURITE TRANSFUSIONNELLE

Garantir au donneur bénévole qui s'est investi que son don sera utilement géré.

GARANTIR LA BONNE UTILISATION DES PRODUITS.

Le parcours de la poche de sang



studio.v2

**GARANTIR LA SUFFISANCE ET ORGANISER LA REPARTITION
DES PRODUITS EN FONCTION DES BESOINS**

**L'EFS Ile-de-France en quelques chiffres
(données 2014/15 – sources rapport d'activité 2014 – rapport de
collecte déc 2015 –
indicateurs marketing-communication IdF 2014)**

- Dons prélevés (sang total, plasma, plaquettes) : **319 975**
- Nombre donneurs sites fixes + collectes mobiles : **338 918**
- Nouveaux donneurs : **61 196**
- Nombre de collectes mobiles : **3 134**
- Nombre de sites fixes de collecte en IdF : **20**
- Nombre de jours de collecte en sites fixes : **5 832**

La distribution/délivrance en Ile-de-France

Produits sanguins délivrés (tous PSL confondus) :
584 546

Nombre de sites de distribution/délivrance : **25**

Nombre de dépôts de sang : **103**

Nombre d'établissements de santé franciliens
approvisionnés : **525**

Nombre de patients transfusés : **90 636**

L'autosuffisance en PSL

Autosuffisance régionale en plaquettes : l'EFS Ile-de-France produit la totalité des besoins nécessaires aux patients franciliens

Autosuffisance nationale en Concentrés de globules rouges (59 % Ile-de-France / 41 % provenant de la province)


L'EFS IdF assure **18 %** de la délivrance nationale en PSL

GARANTIR LA SECURITE TRANSFUSIONNELLE

Risque Résiduel 2011 - 2013	
VIH	1/3 450 000 dons
VHC	1/14 000 000 dons
VHB	1/4 000 000 dons

Source : Josiane PILLONEL - InVS, INTS, EFS, CTSA

Risque résiduel de transmission d'infections virales pour 1 million de dons entre 1992 et 2013



Source : Josiane PILLONEL - InVS, INTS, EFS, CTSA

Dernières séroconversions virales liées à la transfusion:

VIH: 2002

VHC: 2001

VHB: 2007

GARANTIR LA BONNE UTILISATION DES PRODUITS.

Bonne gestion de la mobilisation des donneurs.

**Bonne gestion des stocks de produits sanguins afin de ne pas périmé
(durée de conservation des globules rouges:42 jours, des plaquettes: 5 jours).**

L'EFS collecte, transforme et distribue les produits sanguins aux patients qui en ont besoin en assurant la sécurité des produits transfusés grâce à la générosité des donneurs qui se mobilisent..

MERCI AUX DONNEURS!